

# 効能・効果、用法・用量が他社品と異なる製品一覧

ニプロ株式会社

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「ニプロ」 (アジルサルタン)	アジルバ錠 10mg・20mg・40mg	○小児の用法・用量
アリピプラゾール錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール OD 錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール散 1%「ニプロ」 アリピプラゾール内用液分包 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 (アリピプラゾール)	エビリファイ錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ OD 錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ散 1% エビリファイ内用液 0.1%	○うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
エダラボン点滴静注 30mg「NP」 エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」 (エダラボン)	ラジカット注 30mg ラジカット点滴静注バッグ 30mg	○筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
タクロリムスカプセル 0.5mg・1mg・5mg「ニプロ」 (タクロリム水和物)	プログラフィカプセル 0.5mg・1mg・5mg	○腎移植時の用法用量
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」 (ダプトマイシン)	キュビシン静注用 350mg	○小児の用法・用量
炭酸ランタン顆粒分包 250mg・500mg「ニプロ」 (炭酸ランタン水和物)	ホスレノール顆粒分包 250mg・500mg	○FGFR 阻害剤投与に伴う高リン血症の改善*
デクスメトミジン静注液 200μg「ニプロ」 デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」 (デクスメトミジン塩酸塩)	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」 プレセデックス静注液 200μg/50mL シリンジ「ファイザー」	○集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静(小児) ○小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静
トルバブタン OD 錠 7.5mg・15mg「ニプロ」 (トルバブタン)	サムスカ OD 錠 7.5mg・15mg	○抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
パクリタキセル注射液 30mg「NP」 パクリタキセル注射液 100mg「NP」 (パクリタキセル)	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」** パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」**	○進行又は再発の子宮頸癌(F法の用法・用量)
パロノセトロン静注 0.75mg/2mL シリンジ「NP」 (パロノセトロン塩酸塩)	アロキシ静注 0.75mg	○18歳以下の用法・用量
フェブキソスタット錠 10 mg・20 mg・40 mg「ニプロ」 (フェブキソスタット)	フェブリク錠 10 mg・20mg・40mg	○痛風、高尿酸血症(小児)
プロナンセリン錠 2mg・4mg・8mg「ニプロ」 (プロナンセリン)	ロナセン錠 2mg・4mg・8mg	○統合失調症(小児)
ベグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「ニプロ」 (ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)[ベグフィルグラスチム後続 1])	ジーラスタ皮下注 3.6mg	○同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
ペムトレキセド点滴静注用 100mg・500mg「ニプロ」 (ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物)	アリムタ注射用 100mg・500mg	○扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法***

【医薬品情報お問い合わせ先】 ニプロ株式会社 医薬品情報室 TEL:0120-226-898 FAX:050-3535-8939

\* :ニプロ販売品のみ適応を有する。

\*\* :他社後発品(先発品に当用法・用量無し)

\*\*\* :ニプロ販売品及び他社後発品のみ適応を有する。